

## 信鸽中的天花

这种疾病是由痘病毒引起的。每个物种都有不同的这种病毒家族，鸽子病毒只攻击鸽子和猛禽。

虽然这种疾病可以在一年中的任何时候出现，但它在夏秋和初冬更常见，因为它与作为媒介的蚊子的出现密切相关。

为了进入身体，皮肤必须受到啄食或蚊虫叮咬的伤害。

一旦感染，潜伏期为7天（出现症状）。

它们也可以通过水（饮水器）或鸽舍的灰尘传播。这种疾病的持续时间是3到4周，但如果我们让它自然消退，它可以持续长达4个月。

一旦疾病结束，需要2个月才能完全康复，免疫力持续8个月。

预防它的唯一方法是接种疫苗，在存在疾病的情况下，建议只为健康的鸟类接种疫苗以阻止爆发。病毒通过肝脏，对其造成损害，死亡人数很少，这就是为什么鸽友没有给予它应有的重视。建议在疾病持续期间不要放飞鸽子，少参加比赛。虽然鸽子解决了这个病，但是这种病毒给我们带来了很大的肝损伤，需要很长时间才能恢复。

它通常有4种方式：

皮肤：脓疱见于没有羽毛的地方，如腿和喙区域。

白喉：口腔、喉部和食道出现斑块，如果要清除它们会大量出血，它们会导致声门阻塞和动物死亡。

全身性：它侵入整个循环系统，造成肝损伤，没有任何外在症状。

肿瘤：它是最不常见的，肿瘤出现在头部，如果它不能自行消退，就会进行手术。

## 预防

整个校园必须每年至少接种一次疫苗。幼童不应在4周龄前接种疫苗。重要的是要经常接种鸽病毒疫苗，鸡病毒疫苗不起作用。

它通过划痕接种疫苗，用长矛或刷子打破皮肤而不流血，病毒通过皮肤破口和羽毛状毛囊进入，并在7至10天出现红色脓疱（cascarita），这表明疫苗接种是有效的。疫苗提前2小时从冰箱中取出，禁止洗澡15天，建议给予防御兴奋剂以产生更好的免疫力。可以给予抗生素以防止任何机会性细菌的入侵。

在口腔出现脓疱和斑块之前，您可以每天用棉签蘸碘 4 次，这有助于加快这一过程。

费边波里尼

兽医

省级注册395